

mentionné dans la « Flore d'Auvergne » du frère Héribaud ; 3° *Notochlæna Marantæ* R. Br., Maurs, bords de la Veyre, 14 avril 1909, cette rare Fougère des régions méridionales était connue dans la Haute-Vienne et l'Aveyron, la station de Maurs est intermédiaire aux deux précédentes.

Les Salicacées chinoises

(Suite et fin)*;

PAR Mgr H. LÉVEILLÉ.

1. **S. alba** L. *Sp. Pl.*, ed. 1, p. 1021.

Chine septentrionale; Kiang-Sou; Yun-Nan; Archipel Chusan.

2. **S. andropogon** Lévl., *in Fedde Repertorium*, III, 1906, p. 21.

Kouy-Tcheou.

3. **S. angiolepis** Lévl., *Ibid.*, p. 22.

Kouy-Tcheou.

4. **S. anisandra** Lévl., *Ibid.*

Kouy-Tcheou.

5. **S. babylonica** L. *Sp. Pl.*, ed. 1. p. 1017.

Pé-Tché-Li, Tchin-King; Chantong; Kiang-Sou; Tché-Kiang; Hou-Pé; Chen-Si; Yun-Nan; Archipel Chusan.

6. **S. Biondiana** Seemen, *in Beibl. zu Botan. Jahrbüch.*, n° 82, XXXVI (1905), p. 32.

Chen-Si.

7. **S. Bockii** Seemen, *Engl. Jahrbüch.*, XXIX (1900), p. 278.

Seu-Tchouen.

8. **S. Camusi** Lévl., *Bull. Soc. Agr. Sc. Arts Sarthe*, 2^e série, XXXI (1904), p. 326.

Kouy-Tcheou.

Capsulæ subsessiles, tomentosæ, oblongæ; stylo brevi; stigmata 2 brevissima, paulo emarginata.

9. **S. cantoniensis** Hance, *Journ. of Bot.*, 1868, p. 48.

Kouang-Tong.

10. **S. Caprea** L. *Sp. Pl.*, ed. 1, p. 1020.

Chen-Si; Pé-Tché-Li; Corée.

* Voir plus haut, p. 285.

11. *Salix Cavaleriei* Lévl. nov. sp.

Affinis *S. Yunnanensi* cujus tamen non est forma feminea. Squama enim valde differt. Folia opaca, illa surculorum lanceolata, petiolis, rachibus et nervis hispido-villosis; stipulae triangulares, cordatae, dentatae; achænum ovoideum, glabrum; pedicello squamam duplo superante; squama brunnescens, obtusa, margine ciliata, dorso glabrescens; stigmata 2 sessilia, lobata.

Yun-Nan-Sen, pagode de He-Long-Tan, 19 mars 1905, 11 avril 1906, n°s 658, 669 (*F. Ducloux*).

A *S. triandra* et *S. polyandra* differt achænio conspicue stipitato.

12. *S. cinerea* L., Sp. Pl., 1449.

Mandchourie; Corée.

13. *S. Daltoniana* Anders., Journ Linn. Soc., IV, p. 49.

Yun-Nan.

Var. *Franchetiana* Burkhill, *Enum. of Pl. of China*, II, p. 528.

Seu-Tchouen.

14. *S. daphnoides* Vill. *Delph.*, III, p. 765.

Tchin-King.

15. *S. densifoliata* Seemen, Beibl zu Botan. Jahrbüch., XXI (1896), 53, p. 57.

Chen-Si.

16. *S. dictyoneura* Seemen, Engler Jahrbüch., XXIX (1900), p. 275.

Seu-Tchouen.

17. *S. dodecandra* Lévl., Bull. Soc. bot. Fr., 1905.

Kouy-Tcheou.

18. *S. Duclouxii* Lévl. nov. sp.

Rami fulvo-tomentosi, striati; folia minima, 12-15 mm. \times 4-5 mm., lanceolato-linearia, fulvo-tomentosa vel villosa, sessilia, conferta, obtusa, remotissime et inconspicue denticulata, margine revoluta (in planta mascula folia sunt albescens et glabrescens); amenta mascula sessilia, densa, 2 cm. longa, 5 mm. lata; stamina 2, filamentis coalitis squama duplo longioribus, antheris autem liberis; squama linearis, fulva, barbata, barba squamam excedente; amenta feminea pedunculata, bracteolata; achæni sessili, compresso, triangulari, capselliformi, laxe villoso; stylo nullo; stigmata 2, reflexa bifida.

Yun-Nan : Yun-Nan-Sen, vallons; 23 juillet 1905; n° 670 (*F. Ducloux*).

Var. *Kouytchensis* nov. var.

Folia dentibus confertis, petalis glabrescentibus.

Kouy-Tcheou : bord de la rivière de Ouen-Tsen-Kiao (Kouy-Tin), 23 nov. 1902; n° 728 (*Jul. Cavalerie*).

19. **S. elegans** Wall., *Cat.* 3699.
Yun-Nan.
20. **S. erioclada** Lévl., *in Fedde Repertorium*, III (1906), p. 22.
Kouy-Tcheou.
21. **S. eriophylla** Anders., *Journ. Linn. Soc.*, IV, p. 48.
Hou-Pé; Yun-Nan.
22. **S. Fargesii** Burkill, *Enum. of Plants of China*, II, p. 528.
Seu-Tchouen.
23. **S. floccosa** Burkill, *Ibid.*
Yun-Nan.
24. **S. glandulosa** Seemen, *Beibl. zu Botan. Jahrbüch.*, XXI (1896),
53, p. 55.
Corée; Mandchourie.
25. **S. Henryi** Burkill, *Enum. of Plants of China*, II, p. 530.
(*S. heterochroma* Seemen).
Hou-Pé; Seu-Tchouen.
26. **S. hypoleuca** Seemen, *Beibl. zu Botan. Jahrbüch.*, XXXVI (1905),
82, p. 31.
Chen-Si.
27. **S. koreensis** Anders., *in DC. Prodr.*, XVI, 2, p. 271.
Corée.
28. **S. Lindlyeana** Wall., *Cat.*, 3697.
Yun-Nan.
29. **S. longiflora** Anders., *Journ. Linn. Soc.*, IV, p. 50.
Pé-Tché-Li; Hou-Pé, Seu-Tchouen; Yun-Nan.
Var. *albescens* Burkill, *Enum. of Plants of China*, II, p. 530.
Seu-Tchouen.
30. **S. magnifica** Hemsl., *in Bull. of Miscell. Informat. R. bot. Gard.*
Kew, 1906, 5, p. 163.
Seu-Tchouen.
31. **S. Maximowiczii** Kom., *Fl. Mandshuriæ*, t. II. pars 1, p. 25.
Corée.
32. **S. Mesnyi** Hance, *Journ. of Bot.*, 1882, p. 38.
Kiang-Sou; Tché-Kiang; Kiang-Si; Hou Pé; Yun-Nan; Kouang-Tong;
Formose.
33. **S. microphyta** Franch. *Pl. David.*, II, p. 121.
Seu-Tchouen.

34. **Salix moupinensis** Franch. *Ibid.*, p. 120.
Seu-Tchouen.
35. **S. multinervis** Franch et Savat. *Enumer. Plant. Japon.*, II, p. 504.
Corée.
36. **S. myrtilloïdes** L. *Sp. Pl.*, 1019.
Corée.
37. **S. obscura** Anders., DC. *Prodr.*, XVI, 1, p. 269.
Seu-Tchouen.
38. **S. oreophila** Hook. ex Anders., in *Journ. Linn. Soc.*, IV, p. 57.
Seu-Tchouen; Yun-Nan.
39. **S. pachyclada** Lévl., in *Fedde Repertorium*, III (1906), p. 22.
Kouy-Tchéou.
40. **S. pentandra** L. *Sp. Pl.*, ed. 1, p. 1016.
Yun-Nan.
41. **S. phyllicifolia** L., *Ibid.*
Pé-Tché-Li; Yun-Nan.
42. **S. polyandra** Lévl., *Bull. Soc. Agr. Sc. Arts Sarthe*, 2^e sér., XXXI (1994), p. 325.
Yun-Nan.
43. **S. purpurea** L. *Sp. Pl.*, ed. 1, p. 1017.
Tchin-King; Chan-Tong.
Var. *stipularis* Franch. *Pl. David*, I, p. 284.
Pé-Tché-Li.
44. **S. Pyi** Lévl. nov. sp.
Rami tetragoni, glabri; folia juniora pubescentia, lanceolata, denticulata, acuminata, utrinque viridia; flores folia antecedentes; amenta mascula tantum visa subsessilia, 2-3 foliis suffulta, densiflora; stamina patentia 8 inæqualia, brevia, squamam tamen duplo superantia; squama ovata, obtusa, brunnea, dorso glabra, margine ciliata, intus villosa.
Yun-Nan : Yun-Nan-Sen; vallons du Tchong-Chan, 21 févr. 1906 (*F. Ducloux*).
45. **S. Rosthornii** Seemen, Engler's *Bot. Jahrbücher*, XXIX (1900), p. 276.
Seu-Tchouen.
46. **S. sikkimensis** Anders., in DC. *Prodr.*, XVI, 2, p. 269.
Yun-Nan.
47. **S. Siuzevii** Seemen, in *Fedde Repertorium*, V (1908), p. 17.
Mandchourie.

48. **S. spathulifolia** Seemen, Beibl. zu Bot. Jahrbüch., XXXVI (1905), 82 p. 31.

Chen-Si.

49. **S. subpycnostachya** Burkill, *Enum. of Plant. of China*, II, 532.

Seu-Tchouen.

50. **S. tetrasperma** Roxb., *Cor. Pl.*, I, p. 66.

Yun-Nan: Kouang-Tong; Kouang-Si; Formose.

51. **S. Thunbergiana** Blume ex Anders., in DC. *Prodri.*, XVI, 2, p. 271. Thin-King; Corée.

52. **S. triandra** L. *Sp. Pl.*, ed. 1, p. 1016.

Pé-Tché-Li; Chan-Tong.

53. **S. vagans** Anders. *Salic. bor. Amer.*, 121.

Corée.

54. **S. variegata** Franch. *Pl. David.*, II, p. 120.

Thibet oriental.

55. **S. viminalis** L. *Sp. Pl.*, ed. 1, p. 1021.

Mandchourie.

56. **S. Wallichiana** Anders., in Act. Holm. 1850, p. 447.

Hou-Pé; Chen-Si; Seu-Tchouen; Archipel Chusan.

57. **S. Warburgii** Seemen, Engl. Jahrb., XXIII, Beibl., 57, p. 42.

Formose.

58. **S. Wilsoni** Seemen, Beibl. zu Bot. Jahrbüch., XXXVI (1905), 82, p. 28.

Hou-Pé.

59. **S. yunnanensis** Lévl. nov. sp.

Rami brunnei, glabri, rugosi, angulati, folia petiolata, utrinque viridia, pellucida, floribus coætanea, ovalia, adulta, glaberrima, denticulata; amenta mascula elegantia, gracilia, 4 cm. longa, 10-12 mm. lata, rachi lanata; stamina patentia 7, rarius 5-8, squama duplo longiora; squama dorso glabra, margine villosa, barbata, binervata, ad apicem bifida.

Yun-Nan : Yun-Nan-Sen : plaines, 4 avril 1906 ; n° 653 (*F. Ducloux*).

S. polyandræ et *S. pentandræ* atfinis a quibus squama bifida et brunnea bene differt.

Salices japonicæ novæ.

Salix hamatidens Lévl. nov. sp.

Rami triste brunnei, glabri; folia lanceolata, glabra, petiolata, acuta, subtus pallidiora, conferte hamato-dentata; amenta feminea gracilia,

laxiflora, 5 cm. \times 6-7 mm., pedunculata, pedunculo bracteato; squamæ 3-nerviæ, glaberrimæ, truncatæ vel erosæ, capsulam superantes; capsulæ glabræ, ovato-fusiformes, pedicellatæ; stylus brevissimus; stigmata crassa, patentia, emarginata.

Insula Yezo, secus aquas Sapporo, 13 juin 1908; n°s 263, 264 (*Urb. Faurie*).

Salix sapporoensis Lévl. nov. sp.

Rami lucidi, atropurpurei; folia atroviridia, glaberrima, anguste lanceolata, obscure dentata; amenta 4-6 cm. \times 5 mm., cylindrica, sublaxiflora; squamæ brunneæ, glabræ, obtusæ, capsulis breviores; capsulæ piriformes, sessiles, velutino-villosæ; stylus brevissimus; stigmata cruciata.

Insula Yezo, secus aquas Sapporo, 13 juin 1908; n°s 262, 266, 268 (*Urb. Faurie*).

A *S. Gilgiana* capsula sessili, a *S. lasiogyne* stigmatibus cruciatis recedit.

Salix korsakoviensis Lévl. nov. sp.

Rami robusti, lucidi, striati, folia adulta lète viridia, lanceolata, nervo primario purpureo prominente, supra lucida, subtus pallidiora, glaberrima, crenata, petiolata, acuminata; amenta mascula cylindrica, stamina 2, squama parva obtusissima, valde barbata, multo longiora, barba squamam æquante; amenta feminea augusta, densa, 4 cm. \times 3 mm., squama parva, obtusissima, valde barbata (barba illam æquante) dimidiata capsulæ partem æquans; capsula lanata, ovata, stipitata; stylus longus, capsulam æquans, gracilis; stigmata bifida, gracilia.

Insula Sagalien : Korsakof secus aquas, juin 1908; n°s 274, 276 (*Urb. Faurie*).

Salix cardiophylla Trautt. et Mey. (*Species adhuc incomplete nota*).

Rami nodosi, purpurascentes, lucidi; folia atroviridia, ovalia, petiolata, acuminata, glabra, ad basim rotundata vel attenuata, fere numquam cordata (unde nomen infaustum); amenta mascula pedunculata, elongata, 9-10 cm. \times 6-7 mm., densa; stamina 8-4 longiora; squama glabra striata et obtusa vel truncata; amenta feminea 9-10 cm. longa, 5 mm. lata, præsertim ad basim laxiflora; squama ovata, obtusa, glabra, striata, capsulam æquans; stylus furcatus, brevissimus, interdum usque ad basim fissus; stigmata fragilia, conspicue bifida.

Insula Yezo, secus torrentes Sapporo, 14 juin 1908; n°s 251, 253 (*Urb. Faurie*).